



어린이가 건강한 대한민국

표준예방접종일정표(2025)

| 대상 감염병 | | | 백신 종류 및 방법 | 횟수 | 출생시 | 4주 이내 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 19~23개월 | 24~35개월 | 4세 | 6세 | 11세 | 12세 |
|--------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|--------|---------|-----|---------|---------|---------|-----------|---------|------|---------|---------|--------------|----|--------|----------|
| 국가예방접종 | B형간염 | HepB ¹ | 3 | HepB 1차 | | HepB 2차 | | | | HepB 3차 | | | | | | | | | |
| | 결핵 | BCG(피내용) ² | 1 | | BCG 1회 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 디프테리아 파상풍 백일해 | DTaP ³ | 5 | | | | | DTaP 1차 | DTaP 2차 | DTaP 3차 | | DTaP 4차 | | | | DTaP 5차 | | | |
| | | Tdap ⁴ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Tdap 6차 |
| | 폴리오 | IPV ⁵ | 4 | | | | | IPV 1차 | IPV 2차 | | IPV 3차 | | | | | IPV 4차 | | | |
| | b형 헤모필루스인플루엔자 | Hib ⁶ | 4 | | | | | Hib 1차 | Hib 2차 | Hib 3차 | Hib 4차 | | | | | | | | |
| | 페렴구균 감염증 | PCV ⁷ | 4 | | | | | PCV 1차 | PCV 2차 | PCV 3차 | PCV 4차 | | | | | | | | |
| | | PPSV ⁸ | — | | | | | | | | | | | | | 고위험군에 한하여 접종 | | | |
| | 로타바이러스 감염증 | RV1 ⁹ | 2 | | | | | RV 1차 | RV 2차 | | | | | | | | | | |
| | | RV5 ¹⁰ | 3 | | | | | RV 1차 | RV 2차 | RV 3차 | | | | | | | | | |
| | 홍역 유행성이하선염 풍진 | MMR ¹¹ | 2 | | | | | | | | MMR 1차 | | | | | MMR 2차 | | | |
| | 수두 | VAR ¹² | 1 | | | | | | | | VAR 1회 | | | | | | | | |
| | A형간염 | HepA ¹³ | 2 | | | | | | | | HepA 1~2차 | | | | | | | | |
| | 일본뇌염 | JEV(불활성화 백신) ¹⁴ | 5 | | | | | | | | JEV 1~2차 | | | JEV 3차 | | JEV 4차 | | JEV 5차 | |
| | | LJEV(약독화 생백신) ¹⁵ | 2 | | | | | | | | LJEV 1차 | | | LJEV 2차 | | | | | |
| | 사람유두종바이러스감염증 | HPV ¹⁶ | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | HPV 1~2차 |
| | 인플루엔자 | IIV ¹⁷ | — | | | | | | | | | | | | | IIV 매년 접종 | | | |

• 국가예방접종: 국가에서 권장하는 필수예방접종(국가는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」을 통해 예방접종 대상 감염병과 예방접종 실시(기)준 및 방법을 정하고, 이를 근거로 재원을 마련하여 지원하고 있음)

1 HepB(B형간염): B형간염 표면항원(HBsAg) 양성인 산모로부터 출생한 신생아는 분만 직후 12시간 이내 B형 간염 면역글로불린+HBIG 및 B형간염 백신(1차)을 동시에 접종하고, 2차와 3차 접종은 각각 생후 1개월 및 6개월에 실시. DTaP-IPV-Hib-HepB(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 6가 혼합백신 병용시, 출생시 단독백신을 접종하고, 생후 2, 4, 6개월에 6가 혼합백신으로 접종

2 BCG(결핵): 생후 4주 이내 접종

3 DTaP(디프테리아·파상풍·백일해): DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자) 또는 DTaP-IPV-Hib-HepB(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 혼합백신으로 접종 가능

4 Tdap(파상풍·디프테리아·백일해): 11~12세에 Tdap 백신으로 접종한다. 이후 10년마다 Tdap 추가접종 실시 ※ 단, 백일해 포함 백신(aP) 급기자의 경우, Tdap 백신을 해당 연령에 하거나 Td(파상풍·디프테리아)백신으로 대체 가능

5 IPV(폴리오): 3차 접종은 생후 6개월부터 18개월까지 접종 가능하며, DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 또는 DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 혼합백신으로 접종 가능

폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자 또는 DTaP-IPV-Hib-HepB(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 혼합백신으로 접종 가능

6 Hib(b형 헤모필루스인플루엔자): 생후 2개월~5세 미만 모든 소아를 대상으로 접종하며, 5세 이상은 b형 헤모필루스인플루엔자 감염 위험성이 높은 경우(기능적 또는 해부학적 무비중(감상적혈구증, 비장 절제술 후), 면역결핍질환(특히 IgG2 아형 결핍증), 항암치료에 따른 면역 저하, HIV 감염, 초기 요산 보체결핍증, 조혈세포이식술을 받은 경우) 접종. DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자) 또는 DTaP-IPV-Hib-HepB(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 혼합백신으로 접종 가능

- DTaP-IPV(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월, 4-6세에 DTaP, IPV 백신 대신 접종할 수 있음

- DTaP-IPV/Hib(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월에 DTaP, IPV, Hib 백신 대신 접종할 수 있음

- DTaP-IPV-Hib-HepB(디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염) 혼합백신: 생후 2, 4, 6개월에 DTaP, IPV, Hib, B형간염 백신 대신 접종할 수 있음

※ DTaP 혼합백신 사용 시 기초접종 3회는 동일 제조사의 백신으로 접종하는 것이 원치이며, 생후 15~18개월에 접종하는 DTaP 백신은 제조사에 관계없이 선택하여 접종 가능

7 PCV(페렴구균 단백결합): 13가와 15가 백신 교차 접종 가능

8 PPSV(페렴구균 다당결합): 2세 이상의 페렴구균 감염의 고위험군을 대상으로 하며 건강상태를 고려하여 담당 의사와 충분한 상담 후 접종

※ 페렴구균 감염의 고위험군

- 면역 기능이 저하된 소아: HIV 감염증, 만성신부전과 신증후군, 면역억제제나 방사선 치료를 하는 질환 (악성 종양, 백혈병, 림프종, 호지킨병) 또는 고형 장기 이식, 선천성 면역결핍질환

- 기능적 또는 해부학적 무비중 소아: 겸상구 빈혈 또는 헤모글로빈증, 무비중 또는 비장 기능장애

- 면역 기능은 정상이나 다음과 같은 질환을 가진 소아: 만성 심장 질환, 만성 폐 질환, 만성 간 질환, 당뇨병, 뇌척수액 누출, 인공와우 이식 상태

9 RV1(로타바이러스 감염증): 생후 2, 4개월 2회 접종 (경구투여)

10 RV5(로타바이러스 감염증): 생후 2, 4, 6개월 3회 접종(경구투여)

11 MMR(홍역 유행성이하선염·풍진): 홍역 유행 시 생후 6~11개월에 MMR 백신 접종이 가능하나 이 경우 생후 12개월(1세7개월 되는 생일) 이후에 MMR 백신으로 일정여 맞춰야 접종

12 VAR(수두): 생후 12~15개월에 1회 접종

13 HepA(A형간염): 1차 접종은 생후 12~23개월에 시작

하고 2차는 1차 접종으로부터 6개월 이상 경과한 후 (제조사에 따라 추천 접종간격이 다름) 접종

14 JEV(일본뇌염 불활성화 백신): 1차 접종 1개월 후 2차 접종을 실시하고, 추가 접종은 2차 접종으로부터 11개월 후, 6세, 12세에 접종

15 LJEV(일본뇌염 약독화 생백신): 1차 접종 12개월 후 2차 접종

16 HPV(사람유두종바이러스 감염증): 11~12세 여아에서 6~12개월 간격으로 2회 접종

17 IIV(인플루엔자 불활성화 백신): 생후 6개월~9세 미만 소아에서 접종 첫 해는 최소 4주 간격으로 2회 접종이 필요하며, 이듬해부터는 매년 1회 접종. 접종 첫 해에 1회만 접종 받았다면 다음 해에 4주 간격으로 2회 접종해야 함. 이전에 인플루엔자 접종을 받은 적이 있는 생후 6개월~9세 미만 소아도 유행주에 따라서 2회 접종이 필요할 수 있으므로, 매 정기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 관리 지침을 참고

* 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) > 예방접종 정보 > 예방접종 지식찾기 > 예방접종 지침

백신 두문자어

| 백신종류 | 두문자어 | 백신 |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| B형간염 | HepB | Hepatitis B vaccine |
| 결핵 | BCG(피내용) | Intradermal Bacille Calmette-Guérin vaccine |
| | DTaP | Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis vaccine adsorbed |
| 디프테리아·파상풍·백일해 | Tdap | Tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellular pertussis vaccine, adsorbed |
| | Td | Tetanus and diphtheria toxoids adsorbed |
| 디프테리아·파상풍·백일해·폴리오 | DTaP-IPV | DTaP, IPV conjugate vaccine |
| 폴리오 | IPV | Inactivated poliovirus vaccine |
| b형 헤모필루스인플루엔자 | Hib | Haemophilus influenzae type b vaccine |
| 디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib | DTaP, IPV, Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine |
| 디프테리아·파상풍·백일해·폴리오·b형 헤모필루스인플루엔자·B형간염 | DTaP-IPV-Hib-HepB | DTaP, IPV, Haemophilus influenzae type b conjugate, Hepatitis B vaccine |
| 페렴구균 | PCV | Pneumococcal conjugate vaccine |
| | PPSV | Pneumococcal polysaccharide vaccine |
| | RV1 | Rotavirus vaccine(monovalent) |
| | RV5 | Rotavirus vaccine(pentavalent) |
| 홍역·유행성이하선염·풍진 | MMR | Meesles, mumps, and rubella vaccine |
| 수두 | VAR | Varicella vaccine |
| A형간염 | HepA | Hepatitis A vaccine |
| 일본뇌염 | JEV | Inactivated Japanese encephalitis vaccine |
| | LJEV | Live-attenuated Japanese encephalitis vaccine |
| 사람유두종바이러스 | HPV | Human papillomavirus vaccine |
| 인플루엔자 | IIV | Inactivated influenza vaccine |